Instrucciones para la esofagogastroduodenoscopia (EGD)

Siga estas instrucciones cuidadosamente para prepararse para su examen.

El día del procedimiento	• No coma ni beba nada después de la medianoche, incluidos chicles, pastillas de menta o caramelos duros. • A excepción de los medicamentos para la presión arterial o anticonvulsivos, **NO** tome ningún medicamento recetado ni de venta libre la mañana del procedimiento. Puede usar cualquier colirio e inhalador como de costumbre. • Es política del hospital que toda mujer de entre 10 y 55 años se realice una prueba de embarazo antes del procedimiento.

Transporte	• Es política de HSHS y Prevea que un familiar o amigo de confianza le brinde transporte después del procedimiento. No se permite conducir ni usar transporte público, incluidos taxis, autobuses, Uber o Uber Medical. Se permite el uso de transporte médico. Si no puede contar con un conductor responsable, lamentablemente tendremos que cancelar su procedimiento.
Medicamentos	• Diabetes ° Suspenda los medicamentos con SGLT2 (Jardiance, Invokana, Farxiga, Steglatro) durante los 3 días previos. ° Comuníquese con su médico tratante si tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos orales o inyectables. • Pérdida de peso ° Suspenda la fentermina (Lomaira, Adipex-P) durante los 7 días previos. Comuníquese con su médico para asegurarse de que esto sea seguro. • Anticoagulantes ° **Si está tomando alguno de estos medicamentos y no ha recibido instrucciones sobre cómo suspenderlo, comuníquese con el médico que se lo recetó.** ° * Coumadin, warfarina, Jantoven * Xarelto, rivaroxabán * Lovenox, enoxaparina * Savaysa, edoxabán * Pradaxa, dabigatrán * Eliquis, apixabán * Brilinta, ticagrelor * Effient, prasugrel

	* Plavix, clopidogrel ° *Solo debe evitar tomar aspirina infantil por la mañana de su procedimiento.*

Si tiene alguna pregunta, llame a su médico al 920-496-4700. Contamos con personal de enfermería a su disposición las 24 horas del día para ayudarle.